


Η κίνηση ενός σώματος πάνω σε ένα τραπέζι.

Στην κορυφή Α ενός ορθογώνιου τραπεζιού ηρεμεί ένα μικρό σώμα μάζας $m=0,5\text{kg}$. Σε μια στιγμή δέχεται δυο σταθερές δυνάμεις, όπου η $F_1=0,8\text{N}$ με κατεύθυνση προς την κορυφή Β και η $F_2=0,6\text{N}$ με κατεύθυνση προς την κορυφή Δ.




Σαν αποτέλεσμα της δράσης των παραπάνω δυνάμεων, το σώμα να κινηθεί και μετά από 1,5s να φτάσει στην απέναντι κορυφή Γ του τραπεζιού. Το σώμα δεν παρουσιάζει τριβή με το τραπέζι, ενώ $g=10\text{m/s}^2$.

- i) Να βρεθεί το μέτρο και η κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα.
 - ii) Να υπολογιστεί η διαγώνιος ΑΓ του τραπεζιού.
 - iii) Να βρεθούν τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΒΓ του τραπεζιού.
 - iv) Για την παραπάνω μετακίνηση του σώματος να βρεθούν:
 - α) Το έργο κάθε δύναμης και το έργο της συνισταμένης δύναμης.
 - β) Η (στιγμιαία) ισχύς κάθε δύναμης και η ισχύς της συνισταμένης, τη στιγμή που το σώμα φτάνει στην κορυφή Γ του τραπεζιού.

Απάντηση:

Ας αφήσουμε έξω από τους υπολογισμούς μας το βάρος και την κάθετη αντίδραση του επιπέδου, μιας και η συνισταμένη τους είναι μηδενική, αφού το σώμα ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση (ούτε θα πετάξει!!! ούτε θα τρυπήσει το τραπέζι!!!) και ας κοιτάξουμε το σώμα πάνω από το τραπέζι (κάτοψη). Τότε η εικόνα που θα έχουμε είναι αυτή του παρακάτω σχήματος.



- i) Με τη μέθοδο των παραλληλογράμμου, βρίσκουμε τη συνισταμένη ΣF , η οποία έχει μέτρο:

$$\Sigma F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{0,8^2 + 0,6^2} N = 1N$$

$$\text{Енві схематізмінде } F_1 \text{ ғарнія } \theta, \text{ оған } \varepsilon\phi\vartheta = \frac{F_2}{\Sigma F} = \frac{0,6N}{0,8N} = \frac{3}{4}.$$

ii) Несиистаменің үшін үпілоргісаме параллелі, әжел сағатердің мәтірі және сағатердің діеңтұнсілі, сунепаң толықа апоктісін және сағатердің епітахунсілі, ортада көтөңтұнсілі мен мәтірі:

$$\alpha = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{IN}{0,5kg} = 2m/s^2.$$

Алладаң төтін толықа апоктісін және сағатердің діеңтұнсілі, сунепаң толықа мәтірін көтөңтұнсілі мен мәтірі:

$$x = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{және} \quad v = at$$

Кеңеңде антакатастасын, оған x толықа мәтірін діеңтұнсілі АГ:

$$x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}2 \cdot 1,5^2 m = 2,25m \quad \text{және}$$

$$v = 2 \cdot 1,5m/s = 3m/s$$

iii) Протигоров менең үшін діеңтұнсілі толықа сунепаңдың дінамикасы, үпілоргізонтасынан төтін үшін. Аңа епістремалысаме ортада ғарнія:

$$\eta\mu\vartheta = \frac{F_2}{\Sigma F} = \frac{(B\Gamma)}{(A\Gamma)} \rightarrow (B\Gamma) = \frac{F_2}{\Sigma F} \cdot (A\Gamma) = \frac{0,6N}{1N} \cdot 2,25m = 1,35m$$

$$\sigma\nu\nu\vartheta = \frac{F_1}{\Sigma F} = \frac{(AB)}{(A\Gamma)} \rightarrow (AB) = \frac{F_1}{\Sigma F} \cdot (A\Gamma) = \frac{0,8N}{1N} \cdot 2,25m = 1,8m$$

iv) a) Гиа та параллелі әріға толыңаменің өчінде:

$$W_{F_1} = F_1x \cdot \sigma\nu\nu\theta = F_1x \cdot \frac{(AB)}{(A\Gamma)} = 0,8 \cdot 2,25 \cdot \frac{1,8}{2,25} J = 1,44J$$

$$W_{F_2} = F_2x \cdot \sigma\nu\nu(90^\circ - \theta) = F_2x \cdot \eta\mu\vartheta = F_2x \cdot \frac{(B\Gamma)}{(A\Gamma)} = 0,6 \cdot 2,25 \cdot \frac{1,35}{2,25} J = 0,81J$$

$$W_{\Sigma F} = \Sigma F \cdot x \cdot \sigma\nu\nu 0^\circ = 1 \cdot 2,25J = 2,25J$$

Еңкінде мүмкін болады да, діапитісінде ортада W_{\Sigma F} = W_{F_1} + W_{F_2}.

б) Антістотика гиа төтін (стивидор) өчінде дінамикасы өчінде:

$$P_1 = F_1v \cdot \sigma\nu\nu\vartheta = F_1v \cdot \frac{(AB)}{(A\Gamma)} = 0,8 \cdot 3 \cdot \frac{1,8}{2,25} W = 1,92W$$

$$P_2 = F_2v \cdot \sigma\nu\nu(90^\circ - \theta) = F_2v \cdot \frac{(B\Gamma)}{(A\Gamma)} = 0,6 \cdot 3 \cdot \frac{1,35}{2,25} W = 1,08W$$

$$P_{\Sigma F} = \Sigma F \cdot v \cdot \sigma\nu\nu 0^\circ = 1 \cdot 3 \cdot 1W = 3W$$

Діапитісінде өпісінде ортада P_{\Sigma F} = P_{F_1} + P_{F_2} үрдізінде аныменің, алғашқы ортада көтөңтұнсілінде өзінде ортада

είναι η δύναμη αυτή, που μπορεί να αντικαταστήσει τις συνιστώσες δυνάμεις.

Υλικό Φυσικής-Χημείας

Γιατί το να μοιράζεσαι πρόγραμμα, είναι καλό για όλους...

Επιμέλεια:

Διονύσης Μάργαρης